

【悪性神経膠腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
3週間隔 BV	BV	注射	15mg/kg	day1	21日	
2週間隔 BV	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	
BV+TMZ内服初発:放射線併用1・2週	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m ²	day1 day1-14	14日	day1-14 放射線と併用 BV 90分で投与
BV+TMZ内服初発:放射線併用3・4週	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m ²	day15 day15-28	14日	day15-28 放射線と併用 BV 60分で投与
BV+TMZ内服初発:放射線併用5・6週	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m ²	day29 day29-41	13日	day29-41 放射線と併用 BV 30分で投与
BV+TMZ内服初発:放射線併用7週	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m ²	day42 day42	29日	day42-70 BV 30分で投与
BV+TMZ内服:初発維持・再発	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 150~200mg/m ²	day1,15 day1-5	28日	6サイクル後BV単剤維持へ (BV 15mg/kg 21日)

【小児脳腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
CARE(ETP200mgまで)	CBDCA ETP	注射	450mg/m ² 150mg/m ²	day1 day1-3	28日	
CARE(ETP200~400mg)	CBDCA ETP	注射	450mg/m ² 150mg/m ²	day1 day1-3	28日	ETPを分割して投与 (溶解度の問題で)