

## 医師が記入した「意見書」が必要な感染症一覧

(「保育所における感染症対策ガイドライン」「厚生労働省感染症・予防接種情報」より引用)

病名	主な症状	予防接種	登所のめやす
麻疹 (はしか)	高熱と同時に発疹後、ほほの内側に白い斑点(コプリック斑)	有	解熱した後3日を経過するまで
インフルエンザ	突然の発熱・だるさ 関節痛・頭痛・のどの痛み・鼻水・咳	有	発症後最低5日間目づつ解熱した後、幼児は3日を経過するまで
風疹 (三日はしか)	淡紅色の発疹 リンパ節の腫れ	有	発疹が消失するまで
水痘 (みずぼうそう)	発疹は紅斑から丘疹、水泡、痂皮の順に変化する	有	すべての発疹が痂皮化するまで
流行性耳下腺炎 (ムンプス・おたふくかぜ)	発熱、耳の下の腫れと痛み	有	腫れが発現した後5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
結核	発熱・咳・呼吸困難 チアノーゼ	有	医師により感染の恐れがなくなったと認められるまで
咽頭結膜熱 (プール熱・アデノウイルス感染症)	39℃前後の発熱 のどの痛み・目の充血	無	主な症状が消失し、2日を経過するまで
流行性角結膜炎 (はやり目)	流涙・白眼の充血・目やにまぶたの腫れ	無	医師が感染の恐れがないと認めるまで(症状が消失してから)
百日咳	のどの痛み・鼻水・咳から次第に咳が強くなり1~2週間で特有な咳	有	特有な咳が消失するまで 5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157、O-26、O-111)	激しい腹痛・頻回の水様便・血便 発熱は軽度	無	症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便で、いずれも菌の陰性が確認できること
急性出血性結膜炎	急性結膜炎で、目の充血・目の痛み・目やに 結膜出血	無	医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 (侵襲性髄膜炎菌感染症)	頭痛・発熱・けいれん 意識障害・点状出血・関節炎	有	医師が感染の恐れがないと認めるまで

## 医師の診断を受け保護者が記入する「登所届」が必要な感染症一覧

(「保育所における感染症対策ガイドライン」「厚生労働省感染症・予防接種情報」より引用)

病名	主な症状	予防接種	登所のめやす
溶連菌感染症	突然の発熱・咽頭痛 時に発疹	無	適正な抗菌剤治療開始後、24時間が経過し、全身状態が良くなるまで
マイコプラズマ肺炎	咳・発熱・頭痛	無	発熱や激しい咳が治まっていること 全身状態が良いこと
手足口病	水疱性の発疹が口・手足に出現、発熱は軽度	無	発熱がなく(解熱後1日以上経過し)、普段の食事ができること
伝染性紅斑 (リンゴ病)	軽い風邪症状・頬の赤み 手足に紅斑	無	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (感染性胃腸炎)	発熱・吐き気・嘔吐・下痢	ウイルスのみ有	症状が治まり 普段の食事ができること
ヘルパンギーナ	突然の高熱・のどの痛み 喉に水疱	無	発熱がなく(解熱後1日以上経過し) 普段の食事ができること
RSウイルス感染症	発熱・鼻汁・咳・喘鳴 呼吸困難	ハイリスク児のみ有	重篤な吸気症状が治まり、全身状態が良いこと
帯状疱疹	神経に沿って片側性に 小水疱・神経痛・かゆみ	無	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹	3~4日の高熱 解熱後体幹部の発疹、軟便	無	解熱後1日以上経過し、全身状態が良いこと